

Caristop®



- Caristop Colutorio 0,05%**
Frasco por 250 mL.



- Caristop Colutorio 0,2%**
Frasco por 250 mL.



- Caristop Compuesta Bifluorada**
Pasta dental, 2.500 ppm ión flúor, pomo por 100 gr.



- Caristop Sensitive**
Pasta dental, pomo por 100 gr.



- Caristop 5000**
Pasta dental, pomo por 51 gr.



- Caristop Revelador Dual Tone** Solución
10 mL.



- Caristop adulto mayor**
Cepillo dental para prótesis y aparatos de ortodoncia.

Doldent®



- Doldent Gel Tópico**
Anestésico, 7,5% Benzocaina pomo por 10 gr.

DAILY Caristop®



Daily Caristop Pasta dental Triple protección Anti caries:
Flúor, Nanopartículas de hidroxipatita, Xylitol y Alantoína.

- Daily Caristop Total Care**,
pomo por 80 gr.
- Daily Caristop White:** agrega **Carbón Activado**, pomo por 80 gr.



- Caristop Sensitive:** agrega **Nitrato Potásico**, pomo por 80 gr.



- Daily Caristop Cepillo dental Suave**
Filamentos de textura suave de 0,18 mm.

- Daily Caristop Cepillo dental Medio**
Filamentos de textura media de 0,20 mm.



- Daily Caristop Enjuagatorio Bucal**
Con Flúor 0,05% y Xylitol 10%
Frasco por 250 mL.



- Daily Caristop Cepillo Interdental**
- Nano *PHD: 0,8 mm (Rosado)
- Micro *PHD: 0,9 mm (Verde)
- Mini *PHD: 1,2 mm (Amarillo)



- Daily Caristop Junior**
Pasta dental, 1.100 ppm ión flúor, pomo por 100 gr.



- Caristop Kids**
Cepillo dental con capuchón protector.
Filamentos de textura suave de 0,15 mm.

ORALGENE®



- Oralgene Colutorio 0,12% CHX.**
- Frasco 120 mL.
- Frasco 500 mL.



- Oralgene Colutorio 0,10% CHX.**
Frasco 120 mL.



- Oralgene Gel**
Compuesto 1% de CHX y Fluoruro de sodio 0,11% (495 ppm de ión flúor).
Pomo por 60 gr.

INDICACIONES

- Caristop solución para enjuagatorio bucal 0,05%, uso diario:** Uso diario. Después de cepillarse cuidadosamente los dientes, preferentemente antes de acostarse, enjuagar la boca con Caristop Enjuague Bucal moviendo el líquido vigorosamente entre los dientes de 1 a 2 minutos eliminando posteriormente.
Dosis: En niños hasta 12 años, una cucharadita (5 mL), en mayores y niños > 12 años, una cucharada (10 ml).
- Caristop solución para enjuagatorio bucal 0,02%, uso semanal:** Después de cepillarse cuidadosamente los dientes, preferentemente antes de acostarse, enjuagar la boca con Caristop Enjuague Bucal moviendo el líquido vigorosamente entre los dientes de 1 a 2 minutos eliminando posteriormente.
Dosis: En niños hasta 12 años, una cucharadita (5 mL), en mayores y niños > 12 años, una cucharada (10 ml).
- Caristop 5000, Caristop Sensitive, Caristop Bifluorada:** Colocar aprox. 1g de pasta (equivalente al tamaño de 2 arvejas) en el cepillo seco y cepillar los dientes prolijamente 2-3 minutos inmediatamente después de cada comida o según recomiende el odontólogo, enjuagar luego con abundante agua. No consumir alimentos ni bebidas de ningún tipo, excepto agua, a lo menos 30 minutos después de su uso.
- Caristop Revelador Dual Tone Solución:** Aplique la solución sobre los dientes con algodón o vierta 4 a 5 gotas de solución debajo de la lengua, mueva el líquido alrededor de los dientes durante 30 segundos. Enjuague la boca con agua y descarte el exceso de solución. Examine las áreas con presencia de placa bacteriana, Rojo - indica placa bacteriana nueva y Azul - indica placa bacteriana antigua.
- Oralgene Colutorio 0,10% y 0,12% CHX.:** Enjuagar con 15 mL 2 a 3 veces al día, después de cepillar los dientes. No ingerir agua ni otras bebidas o comida a lo menos 15 minutos después del uso de Oralgene.
- Oralgene Gel dental:** Cepillar los dientes 2 veces al día, después del desayuno y cena. Colocar aprox. 1 g de pasta (equivalente al tamaño de 2 arvejas) en el cepillo seco y cepillar los dientes prolijamente 2-3 minutos inmediatamente después de cada comida o según recomiende el odontólogo, enjuagar luego con abundante agua. No consumir alimentos ni bebidas de ningún tipo, excepto agua, a lo menos 30 minutos después de su uso.
- Doldent:** Aplique una pequeña cantidad de gel sobre las encías irritadas con una mota de algodón o con la yema del dedo. Aplicar 3 a 4 veces al día, en la zona afectada según necesidad.
- Daily Caristop White, Daily Caristop Sensitive, Daily Caristop Total Care pasta dental:** Colocar aprox. 1 g de pasta (equivalente al tamaño de 2 arvejas) en el cepillo seco y cepillar los dientes prolijamente 2-3 minutos inmediatamente después de cada comida o según recomiende el odontólogo, enjuagar luego con abundante agua. No consumir alimentos, ni bebidas de ningún tipo, excepto agua, a lo menos 30 minutos después de su uso.
- Daily Caristop solución para enjuagatorio bucal, uso diario:** después de cepillarse cuidadosamente los dientes, preferentemente antes de acostarse en la noche. Saque la tapa y llénela hasta aproximadamente la mitad. Enjuáguese la boca moviendo el líquido vigorosamente entre los dientes, durante uno o dos minutos, eliminando posteriormente la solución.

DISPONIBLE EN PRINCIPALES FARMACIAS Y DISTRIBUIDORES OFICIALES.