

Caristop®



- Caristop Colutorio 0,05%**
Frasco por 250 mL.



- Caristop Colutorio 0,2%**
Frasco por 250 mL.



- Caristop Compuesta Bifluorada**
Pasta dental, 2.500 ppm ión flúor, pomo por 100 gr.



- Caristop Sensitive**
Pasta dental, 2.500 ppm lón flúor + 5% nitrato de potasio, pomo por 100 gr.



- Caristop 5000**
Pasta dental, 5.000 ppm lón flúor, pomo por 51 gr.



- Caristop Revelador Dual Tone** Solución 10 mL.

Doldent®



- Doldent Gel Tópico**
Anestésico, 7,5% Benzocaina pomo por 10 gr.

DAILY Caristop®



- Daily Caristop Pasta dental Triple protección Anti caries:**
1.500 ppm ión flúor, Nanopartículas de hidroxiapatita, Xylitol y Alantoína.



- Daily Caristop Total Care,**
pomo por 80 gr.

- Daily Caristop White:** con **Carbón Activado**, pomo por 80 gr.

- Daily Caristop Sensitive:** con **Nitrato de Potasio**, pomo por 80 gr.

- Daily Caristop Junior**
Pasta dental, 1.100 ppm flúor, pomo por 100 gr.



- Daily Caristop Cepillo dental Suave**
Filamentos de textura suave de 0,7 mm.

- Daily Caristop Cepillo dental Medio**
Filamentos de textura media de 0,8 mm.

- Daily Caristop Kids Cepillo dental**
Filamentos de textura suave de 0,6 mm.



Daily Caristop Cepillo Interdental

- Nano *PHD:** 0,8 mm (Rosado)

- Micro *PHD:** 0,9 mm (Verde)

- Mini *PHD:** 1,2 mm (Amarillo)



- Daily Caristop Colutorio Bucal**
Con Flúor 0,05% y Xylitol 10%
Frasco por 250 mL.

ORALGENE®



- Oralgene Colutorio 0,12% CHX.**
 Frasco 120 mL.
 Frasco 500 mL.



- Active Oralgene**
Clorhexidina 0,05% + Cloruro de Cetilpiridinio 0,05%.
Frasco 250 mL



- Oralgene Gel**
Compuesto 1% de CHX y Fluoruro de sodio 0,11% (495 ppm de ión flúor).
Pomo por 60 gr.

TAPSIN® SC



- Tapsin SC Polvo 1G**
Paracetamol 1 gr.
20 Sobres.



- Tapsin SC 1G**
Paracetamol 1 gr.
20 Comprimidos recubiertos.

INDICACIONES

- CARISTOP SOLUCIÓN PARA ENJUAGATORIO BUCAL 0,05%, USO DIARIO:** Uso diario. Después de cepillarse cuidadosamente los dientes, preferentemente antes de acostarse, enjuagar la boca con Caristop Enjuague Bucal moviendo el líquido vigorosamente entre los dientes de 1 a 2 minutos eliminando posteriormente. Dosis: En niños hasta 12 años, una cucharadita (5 mL), en mayores y niños > 12 años, una cucharada (10 ml).
- CARISTOP SOLUCIÓN PARA ENJUAGATORIO BUCAL 0,2%, USO SEMANAL:** Después de cepillarse cuidadosamente los dientes, preferentemente antes de acostarse, enjuagar la boca con Caristop Enjuague Bucal moviendo el líquido vigorosamente entre los dientes de 1 a 2 minutos eliminando posteriormente. Dosis: En niños hasta 12 años, una cucharadita (5 mL), en mayores y niños > 12 años, una cucharada (10 ml).
- CARISTOP 5000, CARISTOP SENSITIVE, CARISTOP BIFLUORADA:** Colocar aprox. 1g de pasta (equivalente al tamaño de 2 arvejas) en el cepillo seco y cepillar los dientes prolijamente 2-3 minutos inmediatamente después de cada comida o según recomiende el odontólogo, enjuagar luego con abundante agua. No consumir alimentos ni bebidas de ningún tipo, excepto agua, a lo menos 30 minutos después de su uso.
- CARISTOP REVELADOR DUAL TONE SOLUCIÓN:** Aplique la solución sobre los dientes con algodón o vierta 4 a 5 gotas de solución debajo de la lengua, mueva el líquido alrededor de los dientes durante 30 segundos. Enjuague la boca con agua y descarte el exceso de solución. Examine las áreas con presencia de placa bacteriana, Rojo - indica placa bacteriana nueva y Azul - indica placa bacteriana antigua.
- ORALGENE COLUTORIO 0,10% Y 0,12% CHX.:** Enjuagar con 15 mL 2 a 3 veces al día, después de cepillar los dientes. No ingerir agua ni otras bebidas o comida a lo menos 15 minutos después del uso de Oralgene.
- ACTIVE ORALGENE 0,05% CHX + 0,05% CPC, USO DIARIO:** Enjuagar con 15 ml (o una cucharada) 2 a 3 veces al día después de cepillar los dientes. No enjuagar con agua, ni ingerir alimentos inmediatamente después de usar Active Oralgene 0,05%.
- ORALGENE GEL DENTAL:** Cepillar los dientes 2 veces al día, después del desayuno y cena. Colocar aprox. 1 g de pasta (equivalente al tamaño de 2 arvejas) en el cepillo seco y cepillar los dientes prolijamente 2-3 minutos inmediatamente después de cada comida o según recomiende el odontólogo, enjuagar luego con abundante agua. No consumir alimentos ni bebidas de ningún tipo, excepto agua, a lo menos 30 minutos después de su uso.
- DAILY CARISTOP WHITE, DAILY CARISTOP SENSITIVE, DAILY CARISTOP TOTAL CARE PASTA DENTAL:** Colocar aprox. 1 g de pasta (equivalente al tamaño de 2 arvejas) en el cepillo seco y cepillar los dientes prolijamente 2-3 minutos inmediatamente después de cada comida o según recomiende el odontólogo, enjuagar luego con abundante agua. No consumir alimentos, ni bebidas de ningún tipo, excepto agua, a lo menos 30 minutos después de su uso.
- DAILY CARISTOP SOLUCIÓN PARA ENJUAGATORIO BUCAL, USO DIARIO:** Después de cepillarse cuidadosamente los dientes, preferentemente antes de acostarse en la noche. Saque la tapa y llénela hasta aproximadamente la mitad. Enjuáguese la boca moviendo el líquido vigorosamente entre los dientes, durante uno o dos minutos, eliminando posteriormente la solución.
- DOLDENT:** Aplique una pequeña cantidad de gel sobre las encías irritadas con una mota de algodón o con la yema del dedo. Aplicar 3 a 4 veces al día, en la zona afectada según necesidad.
- DAILY CARISTOP CEPILLO DENTAL SUAVE, MEDIO Y KIDS:** Cepílese los dientes dos veces al día con un cepillo de filamentos suaves. El tamaño y la forma del cepillo deben adaptarse a su boca y permitirle llegar a todas las zonas con facilidad.
 - Sustituya el cepillo de dientes cada tres o cuatro meses.**¿CÓMO USAR EL CEPILLO DENTAL MANUAL?:**
 - Coloque el cepillo de dientes formando un ángulo de 45° con las encías.
 - Mueva el cepillo adelante y atrás suavemente con movimientos cortos que cubran los dientes por completo.
 - Cepille los dientes por las superficies exteriores, las interiores y las de masticar.
 - Para limpiar las superficies interiores de los dientes frontales, incline el cepillo en sentido vertical y realice varios movimientos arriba y abajo.
 - Cepílese la lengua para eliminar las bacterias y mantener el aliento fresco.
- DAILY CARISTOP CEPILLO INTERDENTAL TAMAÑO NANO, MICRO Y MINI:** El cepillo interproximal es de uso obligatorio para pacientes con tratamientos de ortodoncia, implantes dentales, puentes o enfermedad periodontal, ya que permite llegar a zonas donde un cepillo normal no lo hace.**¿CÓMO USAR EL CEPILLO INTERDENTAL?**
 - El cepillo debe pasar de forma horizontal entre los dientes y en forma muy suave.
 - Una vez se encuentre en el espacio interproximal (entre dientes adyacentes) debes moverlo de adelante hacia atrás suavemente.
 - Cambie su cepillo cada vez que se vea dañado o haya perdido su forma original.

DISPONIBLE EN PRINCIPALES FARMACIAS Y DISTRIBUIDORES OFICIALES.